



АКНЕКУТАН®


ИЗОТРЕТИНОИН
С УВЕЛИЧЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ
ДЛЯ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ И РЕЗИСТЕНТНЫХ
ФОРМ АКНЕ

АКНЕКУТАН® – ИННОВАЦИОННАЯ ОРАЛЬНАЯ ФОРМА ИЗОТРЕТИНОИНА С УВЕЛИЧЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ, ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ LIDOSE®

Благодаря 2 дополнительным жирорастворимым компонентам (технология LIDOSE®), биодоступность изотретиноина в АКНЕКУТАНЕ® увеличивается на 20%, сравнительно с препаратами изотретиноина в обычной форме выпуска.



Динамика изменения концентраций изотретиноина в плазме крови¹



$$\begin{array}{l} 8 \text{ МГ} \\ \text{ИЗОТРЕТИНОИНА LIDOSE}^{\circledR} \\ \text{(АКНЕКУТАН)} \end{array} = \begin{array}{l} 10 \text{ МГ} \\ \text{ОБЫЧНОГО} \\ \text{ИЗОТРЕТИНОИНА} \end{array}$$
$$\begin{array}{l} 16 \text{ МГ} \\ \text{ИЗОТРЕТИНОИНА LIDOSE}^{\circledR} \\ \text{(АКНЕКУТАН)} \end{array} = \begin{array}{l} 20 \text{ МГ} \\ \text{ОБЫЧНОГО} \\ \text{ИЗОТРЕТИНОИНА} \end{array}$$

Технология LIDOSE® позволяет:

» Увеличить процент растворенной фракции изотретиноина в капсуле на **13,5%**¹

» Повысить усвояемость изотретиноина в ЖКТ (биодоступность изотретиноина увеличивается на **20%**¹)


» Сократить разовую и курсовую дозы изотретиноина на **20%**¹, с полным сохранением эффективности продукта

ПРЕИМУЩЕСТВА АКНЕКУТАН® ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЫЧНОЙ ФОРМЫ ИЗОТРЕТИНОИНА

1. ПОТЕНЦИАЛЬНО СНИЖАЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ НЕАКТИВНОГО ИЗОТРЕТИНОИНА, ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ

Показатели сравнения	Обычная форма изотретиноина 20 мг	Изотретиноин LIDOSE® (АКНЕКУТАН®) 16 мг	
Не абсорбируется, но присутствует в пищеварительном тракте	8 мг	4 мг	Меньше побочных эффектов
Биодоступность	12 мг	12 мг	Эффективность полностью сохраняется

2. СНИЖАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА С ПИЩЕЙ



ПОСТКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА АКНЕКУТАН®

Результаты открытого несравнительного исследования по оценке эффективности, безопасности и переносимости лекарственного препарата АКНЕКУТАН® у больных, страдающих тяжелыми формами акне и акне, резистентными к другим видам терапии³.

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ

ВЫВОДЫ:

1. Препарат АКНЕКУТАН® является высокоэффективным лекарственным средством в 100% случаев при лечении пациентов, имеющих акне средней и тяжелой формы и акне, резистентные к другим видам терапии.
2. Препарат АКНЕКУТАН® может быть рекомендован как основной препарат для лечения пациентов, имеющих акне средней и тяжелой формы и акне, резистентных к другим видам терапии, а также как препарат выбора для лечения пациентов, имеющих акне средней формы тяжести.
3. Препарат АКНЕКУТАН® может быть рекомендован как препарат, не требующий дополнительной терапии и безопасный при правильном соблюдении инструкции применения препарата для лечения пациентов, имеющих акне средней и тяжелой формы и акне, резистентные к другим видам терапии.

Результаты клинического исследования эффективности препарата АКНЕКУТАН® у пациентов с акне тяжелой степени тяжести, а также акне, резистентными к другим видам терапии⁴.

КЛИНИКА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ИМ. В.А. РАХМАНОВА УКБ № 2 ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА

ВЫВОДЫ:

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о высокой степени эффективности, безопасности и хорошей переносимости АКНЕКУТАНА® при лечении больных, страдающих тяжелыми формами акне, а также акне, резистентными к другим видам терапии.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АКНЕКУТАН® У ПОДРОСТКОВ


Практические аспекты применения изотретиноина в лечении акне у подростков
М.М. Тлиш, А.С. Елистратова, М.И. Глузмин⁵

ГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ

Возраст пациентов: от 12 до 18 лет

Количество пациентов: 43 человека, из них 18 девушек, 25 юношей.

Диагноз: среднетяжелые и тяжелые формы акне



Акнекутан назначался в виде монотерапии в суточной дозе 0,4-0,8 мг/кг до достижения курсовой дозы 120 мг/кг.



ВЫВОДЫ:

1. Результаты исследования применения препарата АКНЕКУТАН® указывают на высокий уровень его эффективности и переносимости у подростков.
2. Препарат может быть рекомендован для монотерапии среднетяжелых и тяжелых акне у пациентов подросткового возраста.

РАСЧЕТ СУТОЧНОЙ И КУРСОВОЙ ДОЗЫ АКНЕКУТАНА®

Вес, кг*	0,4 мг/кг			0,6 мг/кг			0,8 мг/кг		
	Количество капсул	Продолжительность лечения	Количество упаковок**	Количество капсул	Продолжительность лечения	Количество упаковок**	Количество капсул	Продолжительность лечения	Количество упаковок**
50	1 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	8 месяцев	8 уп. 16мг, 8 уп. 8мг	2 капс. 16мг	6 месяцев	12 уп. 16мг	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	5 месяцев	10 уп. 16мг, 5 уп. 8мг
55	1 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	9 месяцев	9 уп. 16мг, 9 уп. 8мг	2 капс. 16мг	7 месяцев	14 уп. 16мг	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	5 месяцев	11 уп. 16мг, 5 уп. 8мг
60	1 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	10 месяцев	10 уп. 16мг, 10 уп. 8мг	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	6 месяцев	12 уп. 16мг, 6 уп. 8мг	3 капс. 16мг	5 месяцев	15 уп. 16мг
65	2 капс. 16мг	8 месяцев	16 уп. 16мг	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	6 месяцев	13 уп. 16мг, 6 уп. 8мг	3 капс. 16мг	5 месяцев	16 уп. 16мг
70	2 капс. 16мг	9 месяцев	18 уп. 16мг	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	7 месяцев	14 уп. 16мг, 7 уп. 8мг	3 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	5 месяцев	15 уп. 16мг, 5 уп. 8мг
75	2 капс. 16мг	9 месяцев	18 уп. 16мг	3 капс. 16мг	6 месяцев	18 уп. 16мг	3 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	5 месяцев	16 уп. 16мг, 5 уп. 8мг
80	2 капс. 16мг	10 месяцев	20 уп. 16мг	3 капс. 16мг	7 месяцев	20 уп. 16мг	4 капс. 16мг	5 месяцев	20 уп. 16мг
85	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	8 месяцев	17 уп. 16мг, 8 уп. 8мг	3 капс. 16мг	7 месяцев	21 уп. 16мг	4 капс. 16мг	5 месяцев	21 уп. 16мг
90	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	9 месяцев	18 уп. 16мг, 9 уп. 8мг	3 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	7 месяцев	19 уп. 16мг, 7 уп. 8мг	4 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	5 месяцев	20 уп. 16мг, 5 уп. 8мг
95	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	10 месяцев	19 уп. 16мг, 9 уп. 8мг	3 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	7 месяцев	20 уп. 16мг, 7 уп. 8мг	4 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	5 месяцев	21 уп. 16мг, 5 уп. 8мг
100	2 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	10 месяцев	20 уп. 16мг, 10 уп. 8мг	3 капс. 16мг и 1 капс. 8мг	7 месяцев	21 уп. 16мг, 8 уп. 8мг	5 капс. 16мг	5 месяцев	25 уп. 16мг

*Весовая категория определяется верхней границей 5 кг интервала, в котором находится масса тела пациента. Например, 75 для массы тела 72 кг.

**Количество упаковок АКНЕКУТАНА® соответствует курсовой дозе изотретиноина 115 - 120 мг/кг.

Рекомендуемая **суточная доза** изотретиноина **0,4 - 0,8 мг** на кг веса пациента.

Рекомендуемая **курсовая доза** изотретиноина **100 - 120 мг** на кг веса пациента.

Пример расчета курсовой дозы изотретиноина (КД)⁶:

$$КД = 30 \times (d_1 + \dots + d_i) / m$$

Где 30 - среднее число дней в месяце,

d_1 и d_i - суточная доза препарата в 1-й и последующие (i) месяцы терапии, мг.

m - масса тела пациента, кг.

Продолжительность лечения — от 4 до 7 мес. в зависимости от суточной дозы препарата.

Примерно у 85% пациентов, набравших КД, наблюдается полное излечение или длительная ремиссия⁶.

¹ Данные регистрационного досье на препарат Акнекутан от производителя СМБ Технолоджи С.А.

² Отчет от производителя СМБ Технолоджи С.А. по исследованию ISOPK 03. 04 Version 1.2003

³ Косорукова И.М., Данилова А.А. «О результатах открытого несравнительного исследования по оценке эффективности, безопасности и переносимости лекарственного препарата Акнекутан у больных, страдающих тяжелыми формами акне и акне, резистентными к другим видам терапии» Вестник дерматологии и Венерологии №2 2012

⁴ Халдин А.А., Мареева Е.Б., Скворцова А. И. «Патогенетические подходы к терапии вульгарных угрей» Российский журнал кожных и венерических болезней №3 2012

⁵ М. М. Тлиш, А. С. Елистратова, М. И. Глузмин "Практические аспекты применения изотретиноина в лечении акне у подростков" Вестник дерматологии и венерологии №4 2013

⁶ Моначов С. А. «Современный взгляд на патогенез акне и новые возможности терапии заболевания» Русский медицинский журнал 2004 №18

НАЗНАЧАЕМ АКНЕКУТАН®



Если пациент мужчина

- 1** Взять кровь на биохимический анализ (АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, триглицериды, холестерин).
- 2** Повторять биохимический анализ крови через месяц после начала терапии, а затем каждые 3 месяца.
- 3** В связи с возможностью проявления таких побочных эффектов как сухость губ и кожных покровов рекомендуется профилактически выписать средства по уходу за кожей.
- 4** Предупредить о возможности кратковременного обострения заболевания на 2 неделе терапии, с последующим регрессом симптоматики.
- 5** Объяснить пациенту, что рекомендованная дозировка АКНЕКУТАНА® принимается однократно или дважды в сутки вместе с пищей для более эффективного усвоения препарата.
- 6** Предупредить пациента о необходимости исключить алкоголь во время терапии АКНЕКУТАНОМ®, ограничить продукты, богатые витамином А (морковь, печень, яйца и др.), не употреблять излишне жирные продукты, не применять поливитамины и пищевые добавки.
- 7** Предупредить пациента о необходимости ограничивать воздействие солнечной инсоляции и УФ-терапии. При необходимости использовать солнцезащитный крем с высоким значением защитного фактора, не менее 15 SPF.
- 8** Объяснить пациенту, что он не может являться донором крови в период лечения АКНЕКУТАНОМ® и в течение 30 дней после окончания терапии.
- 9** Объяснить пациенту, что терапия АКНЕКУТАНОМ® – самая эффективная терапия акне, но для стойкой ремиссии нужно выдержать курсовую дозу изотретиноина 100–120 мг/кг массы тела, то есть начав терапию пациент должен помнить о необходимости прохождения всего курса целиком.
- 10** Напомнить пациенту, что в случае какого-либо недомогания, возможно связанного с приемом препарата он незамедлительно должен сообщать о нем доктору, если пациент почувствует симптомы депрессии или состояние угнетенности об этом также необходимо сообщить доктору для коррекции дозировки АКНЕКУТАНА.
- 11** Объяснить пациенту, что АКНЕКУТАН® относится к препаратам строго индивидуального приема и нужно исключить возможность приема препарата другими лицами.



Если пациент женщина


АКНЕКУТАН® АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

- 1** Обязательно получить отрицательный результат теста на беременность:
 - до начала терапии АКНЕКУТАНОМ® (в день назначения АКНЕКУТАНА® или за 3 дня до визита пациентки к врачу),
 - каждый месяц терапии АКНЕКУТАНОМ®,
 - через 5 недель после окончания терапии АКНЕКУТАНОМ®.
- 2** Обязательно использовать эффективные способы контрацепции (рекомендуется двойной метод контрацепции) во время терапии АКНЕКУТАНОМ®, за месяц до планируемой терапии, и на протяжении месяца после терапии АКНЕКУТАНОМ®.
- 3** Взять расписку с пациентки о том, что она предупреждена и обязуется соблюдать рекомендации по контрацепции на протяжении всего периода терапии АКНЕКУТАНОМ® и 5 недель после терапии.
- 4** **ДАЛЕЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК ПРИ ТЕРАПИИ У МУЖЧИН.**

АКНЕКУТАН® – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ТЕРАПИИ

Мобильное приложение для пациентов «АКНЕКУТАН»

позволяет:



Уточнить информацию о препарате АКНЕКУТАН® и особенностях его применения



Следить за графиком лечения и отслеживать результаты терапии



Консультироваться с лечащим врачом дистанционно



Соблюдать важные правила по применению препарата



Фиксировать результаты анализов и смотреть их в динамике



Настроить напоминания о предстоящем визите к доктору, приеме препарата

Скачать по ссылке:



Виртуальный кабинет врача

cabinet.aknecutan.ru

позволяет:



Следить за курсом лечения у тех пациентов, которым был назначен АКНЕКУТАН®, и которые используют приложение АКНЕКУТАН® для контроля терапии.



Иметь доступ к последним обновлениям пациентов (анализы крови, фотографии, накопленная дозировка препарата).



Знакомиться с последними научными статьями по препарату АКНЕКУТАН®.



Задать вопрос компании-производителю АКНЕКУТАНА® по препарату или работе виртуального кабинета.



Общаться с пациентами дистанционно.